



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Potenza lì, 11/11/2013

Dipartimento di Prevenzione
Collettiva della Salute Umana
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Prot.n. 20130161495

del 12-11-2013

Ai Sig.ri Medici di Igiene
LORO SEDI

OGGETTO : Campagna antinfluenzale e antipneumococcica 2013-2014.

Si comunica alle SS.LL. che su tutto il territorio della ex ASL 2 avrà inizio a partire dal 14 novembre 2013, la campagna antinfluenzale con l'obiettivo di ridurre significativamente la morbosità della malattia, nonché le sue complicanze. A tale scopo è necessario raggiungere elevate coperture nei gruppi di popolazione target, in particolare negli ultra 64enni e nei soggetti ad alto rischio di tutte le età ecc.

Si rammenta che l'obiettivo minimo aziendale di copertura vaccinale nella popolazione target è del 65% a fronte del 56% raggiunto nello scorso anno, a tal fine si raccomanda ad ogni operatore la sensibilizzazione dei MMG, dei PLS, degli specialisti ospedalieri, dei servizi territoriali, delle associazioni dei malati, ecc.

Inoltre, in concomitanza con il periodo della vaccinazione antinfluenzale nonché durante l'intero anno solare potranno essere sottoposti a vaccinazione antipneumococcica con vaccino 13 valente coniugato soggetti di età ≥ 64 anni nonché soggetti a rischio di età ≤ 64 anni (DGR Basilicata n.696 del 11 /06/2013 "Programma di campagna vaccinale con vaccino antipneumococcico 13 valente verso gli anziani 65enni e le categorie a rischio").

Presso questa U.O. sono disponibili i seguenti vaccini antinfluenzali trivalenti stagionali:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Vaxigrip | Split |
| • Intanza 15 μ g | Intradermico |
| • Intanza 9 μ g | Intradermico |
| • Fluad | Audiuvato con MF59 |
| • Inflexal V | Virosomale |



In considerazione delle tipologie di vaccini in dotazione, si invia schema per la somministrazione nelle varie fasce di età:

ETA'	VACCINO	DOSI E MODALITA' SOMMINISTRAZIONE
6-36 mesi	Split (Vaxigrip) Virosomale (Inflexal V)*	<ul style="list-style-type: none">- $\frac{1}{2}$ dose (0,25ml) ripetuta a distanza di almeno 4 settimane per bambini che vengono vaccinati per la prima volta;- $\frac{1}{2}$ dose (0,25ml), se già vaccinati negli anni precedenti.
36 mesi-9 anni	Split (Vaxigrip) Virosomale (Inflexal V)*	<ul style="list-style-type: none">- 1 dose (0,50ml) ripetuta a distanza di almeno 4 settimane per bambini che vengono vaccinati per la prima volta;- 1 dose (0,50ml) se già vaccinati negli anni precedenti.
10-17 anni	Split (Vaxigrip) Virosomale (Inflexal V)	<ul style="list-style-type: none">- 1 dose (0,50 ml)- 1 dose (0,50 ml)
18-59 anni	Intradermico (Intanza) (9 μ g) Virosomale (Inflexal V)	<ul style="list-style-type: none">- 1 dose- 1 dose (0,50 ml)
60-64 anni	Itradermico (Intanza) (15 μ g) Virosomale (Inflexal V)	<ul style="list-style-type: none">- 1 dose- 1 dose (0,50ml)
>=65 anni	Adiuvato con MF59 (Fluad) Intradermico (Intanza) (15 μ g)	<ul style="list-style-type: none">- 1 dose (0,5ml)- 1 dose

* al di sotto dei 5 anni, a causa della possibilità di insorgenza di febbre elevata con INFLEXAL V, è opportuno valutare l'utilizzo di vaccino alternativo (VAXIGRIP)

Si trasmette copia della Circolare Ministeriale contenente l'elenco delle categorie a rischio per le quali la vaccinazione stagionale è fortemente raccomandata, nonché lo schema riepilogativo di copertura da inviare** entro il 15/01/2014 e la scheda di reazione avversa prevista dalle vigenti disposizioni.

Tanto al fine di uniformare l'attività vaccinale antinfluenzale su tutto il territorio della ex ASL2.

**per il Distretto di Villa d'Agri al Dr.LAVECCHIA.

Il Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Francesco Saverio NEGRONE