



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dipartimento Prevenzione
Collettiva della Salute Umana
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Via della Fisica, 18 A/B – Potenza

Prot. n. 20160015638

del 04-02-2016

Ai Medici di Medicina Generale
Ai Pediatri di libera scelta
ASP

Oggetto: Infezione da virus ZIKA - Misure di prevenzione e controllo.

Recentemente è stato evidenziato in alcune aree geografiche l'insorgenza di casi di infezione da virus Zika, come contenuto nel poster del Ministero della Salute, allegato alla presente.

Premesso che, allo stato, la trasmissione avviene tramite la puntura della zanzara tipo Aedes, la sorveglianza va effettuata nei confronti dei soggetti che abbiano soggiornato in zone a rischio ove è presente il vettore.

L'infezione, che può decorrere in maniera asintomatica, è stata dimostrata invece responsabile di severe complicanze a carico del feto, qualora ad esserne colpite siano donne in stato di gravidanza.

A titolo divulgativo si trasmette il vademecum stilato dal Ministero della Salute contenente le informazioni e le raccomandazioni a riguardo.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Collettiva della Salute Umana
Dr. Francesco Saverio Negrone



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

MALATTIA DA VIRUS ZIKA

Consigli ai viaggiatori internazionali diretti o provenienti dai Paesi affetti

Il virus è trasmesso dalla zanzara del genere *Aedes*

Paesi con trasmissione locale confermata (dato aggiornato al 20/01/2016)

Brasile, Bolivia, Barbados, Capo Verde, Colombia, El Salvador, Ecuador, Fiji, Guiana

Francese, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinique, Messico, New Caledonia, Puerto Rico, Panama, Paraguay, Samoa, Solomon Islands, Suriname, Vanuatu, Venezuela.

L'elenco aggiornato delle aree affette può essere consultato alla pagina web:

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx

In caso di gravidanza, presenza di disturbi del sistema immunitario o gravi malattie croniche si consiglia di consultare il proprio medico curante prima di partire.

AL VOSTRO ARRIVO IN QUESTE REGIONI

In tutti i casi si prega di rispettare le raccomandazioni delle autorità locali e:

- **avvalersi di misure di protezione individuale contro le punture di zanzara al chiuso e all'aperto, soprattutto dall'alba al tramonto;**
- **In caso di gravidanza prestare particolare attenzione e rinforzare le misure di protezione individuale**

***Per qualsiasi necessità contattare
la Vostra Ambasciata o il Vostro Consolato***

AL VOSTRO RITORNO IN ITALIA

se nei 21 giorni che seguono il Vostro ritorno si dovessero presentare sintomi compatibili con la malattia da virus Zika quali: febbre, dolori articolari e muscolari, eruzioni cutanee, congiuntivite

**a scopo precauzionale
contattate il vostro medico di fiducia
riferendo del vostro recente viaggio**

Le donne in gravidanza che hanno viaggiato in aree in cui è stata riportata trasmissione locale del virus Zika, devono dar notizia del loro viaggio durante le visite prenatali al fine di essere valutate e monitorate in modo appropriato.

Aggiornamenti e FAQ disponibili alla pagina web

[http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=237&area=Malattie trasmesse da vettori](http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=237&area=Malattie%20trasmesse%20da%20vettori)

Ministero della Salute: www.salute.gov.it

Informazioni per i viaggiatori diretti in zone con trasmissione locale di Zika virus 23 dicembre 2015

**Dichiarazione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria (HSC - Health Security Committee) [1]
basato sul contributo scientifico del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control)**

- I viaggiatori diretti in Paesi che hanno riportato la trasmissione locale del virus Zika, dovrebbero essere preventivamente informati del focolaio in corso. L'elenco delle zone colpite nel corso degli ultimi nove mesi è consultabile alla pagina web http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx
- I viaggiatori che visitano questi Paesi dovrebbero avvalersi di misure di prevenzione individuale contro le punture di zanzara al chiuso e all'aperto, soprattutto dall'alba al tramonto. Si consiglia pertanto di:
 - Utilizzare repellenti per zanzare in conformità con le istruzioni indicate sull'etichetta del prodotto. Repellenti a base DEET non sono raccomandati in presenza di bambini sotto i tre mesi di età, mentre possono essere utilizzati senza controindicazioni specifiche da donne in gravidanza.
 - Indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi, soprattutto durante le ore in cui il tipo di zanzara che trasporta il virus Zika (Aedes) è più attivo.
 - Dormire o riposarsi in camere schermate o climatizzate e utilizzare zanzariere, anche durante il giorno
- I viaggiatori con disturbi del sistema immunitario, con gravi malattie croniche, in stato di gravidanza o accompagnati da bambini piccoli devono consultare il proprio medico prima della partenza, al fine di ottenere raccomandazioni sull'uso di repellenti e altre misure preventive.
- I viaggiatori che presentano sintomi compatibili con la malattia da Zika virus entro le tre settimane dal ritorno da aree in cui è stata riportata trasmissione locale del virus, sono invitati a contattare il proprio medico avendo cura di riferire del loro recente viaggio.
- Le donne in stato interessante che hanno viaggiato in aree in cui è stata riportata trasmissione locale del virus Zika, devono dar notizia del loro viaggio durante le visite prenatali al fine di essere valutate e monitorate in modo appropriato.

[1] La dichiarazione si basa sull'articolo 11 "Coordinamento della risposta", della decisione 1082/2013 / UE relativa alle gravi minacce transfrontaliere per la salute e può essere adattato alle esigenze e circostanze degli Stati membri. "